For Research Use Only

Western Blot 半干法转膜液

Catalog Number: PR20008



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech生产的Western Blot半干法转膜液适用于Western Blot 半干法电转膜。本产品是一种安 全无毒的转膜液,不含甲醇及其它有毒试剂。本品可配制Western半干法转膜液1升,方法非常便

捷。

产品成分

Transfer Buffer 干粉

包装规格

1 L

保存条件

室温保存,1年有效。

使用方法

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内,加入蒸馏水到约700 mL(或500 mL),溶解。然后在量筒中

定容到 800 mL(或 600 mL)。混匀后即可使用。

2. 针对一般分子量蛋白质的转膜液,可以取 800 mL Western Blot 转膜液,加入 200 mL 甲醇,混 匀后使用(甲醇含量 20%),如果体积不够 1 L,建议用纯水补足体积。注:针对小分子量蛋白 质的转膜液(分子量 20 kDa 以下),可以取 600 mL Western Blot 转膜液,加入 400 mL 甲醇,混

匀后使用(甲醇含量 40%),如果体积不够 1 L,建议用纯水补足体积。 注意: 含甲醇的溶液建议用多少配制多少,没用完的应该丢弃。

3. Western Blot 操作请参考本公司网站: www.ptgcn.com

注意

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状,如出现沉淀,可以水浴加热至沉淀溶解。

2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。